



แบบประเมินความเสี่ยงก่อนการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และคำยินยอมในการรับวัคซีน

ชื่อและนามสกุลผู้รับวัคซีน (หรือติดสติ๊กเกอร์ประจำตัวผู้ป่วยของสถานพยาบาล)

วัน/เดือน/ปี เกิด

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้รับวัคซีน

เคยมีประวัติแพ้วัคซีนชนิดที่กำลังจะฉีด หรือแพ้สารประกอบในวัคซีนชนิดที่กำลังจะฉีด

มีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้

ห้ามให้วัคซีน

ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา

ไม่ควรให้วัคซีนยกเว้นกรณีจำเป็น

มีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดต่ำ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ หรือ รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ประเมินความเสี่ยงก่อนให้วัคซีน
และให้วัคซีนด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ

ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน (หากไม่แน่ใจควรมานำยาของท่านให้บุคลากรทางการแพทย์ดู)

หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือมารดาที่กำลังให้นมบุตร

ได้รับการถ่ายเลือด พลาสมา ผลิตภัณฑ์จากเลือด สารประกอบของเลือด อิมมูโนโกลบูลิน หรือยาต้านไวรัส ภายใน 90 วัน ที่ผ่านมา

พิจารณาให้วัคซีนตาม
ดุลยพินิจของแพทย์

กำลังเจ็บป่วยเฉียบพลันอยู่ในขณะนี้ หรือได้อนุญาตตัวและออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน 14 วัน

กำลังมีอาการป่วย เช่น มีไข้ หนาวสั่น หายใจลำบาก อ่อนเพลียกล้ามเนื้อ

ควรเลื่อนการให้วัคซีนออกไป

ไม่มีความเสี่ยงต่างๆข้างต้น (ทั้งนี้อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเช่นไข้หวัดทั่วไป สามารถให้วัคซีนได้ ผู้มีโรคประจำตัว ซึ่งอาจเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตเรื้อรัง โรคมะเร็ง หรือโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ที่ไม่รุนแรง สามารถให้วัคซีนได้)

สามารถให้วัคซีนได้ตามปกติ

ระบบประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย

หมายเหตุ

- ▶ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่มีข้อบ่งใช้ในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี (สำหรับวัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกา และของ Sinovac)
- ▶ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไม่มีข้อบ่งใช้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (สำหรับวัคซีนโควิด-19 ของ Sinovac)
- ▶ ในปัจจุบัน ยังไม่มีข้อมูลปฏิกิริยา (interaction) ระหว่างวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับยาอื่นๆ รวมถึงวัคซีนชนิดอื่นๆ ทั้งนี้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถให้ร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างก่อนหรือหลังอย่างน้อย 1 เดือน

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจในข้อความ ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ และได้ทำการประเมินความเสี่ยงแล้ว
ข้าพเจ้ายินดีรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

.....
(ลงชื่อผู้รับการฉีดวัคซีน)

.....
(ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล)

วัคซีนเข็มที่ 1

ชื่อวัคซีน :

วันที่ฉีด :

Lot No.:

วัคซีนเข็มที่ 2

ชื่อวัคซีน :

วันที่ฉีด :

Lot No.:

คู่มือผู้รับวัคซีน

คำแนะนำและข้อควรทราบก่อนการฉีดวัคซีน


- ▶ วัคซีนมีข้อบ่งใช้สำหรับฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- ▶ เพื่อให้ได้ผลในการสร้างภูมิคุ้มกันสูงสุด ท่านจำเป็นต้องได้รับวัคซีนตัวเดียวกันจำนวน 2 ครั้ง ห่างกันประมาณ 1-3 เดือน และไม่ควรเปลี่ยนชนิดของวัคซีน
- ▶ การให้วัคซีนมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยผ่านกลไกการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันในการต่อต้านไวรัสเมื่อได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายในอนาคต แต่ไม่ได้ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้นการปฏิบัติต่างๆ เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อ เช่น การสวมหน้ากากป้องกัน การเว้นระยะห่าง การล้างมือบ่อยๆ ฯลฯ ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ได้รับวัคซีนต้องให้ความสำคัญในช่วงที่มีการระบาดของโรค
- ▶ วัคซีนอาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแตกต่างกันไปในผู้ที่ได้รับวัคซีนแต่ละราย และไม่สามารถยืนยันการป้องกันโรคหรือการติดเชื้อในผู้ที่ได้รับวัคซีนได้ครบทั้งหมดทุกราย
- ▶ ระยะเวลาในการเกิดภูมิคุ้มกันของโรคโควิด-19 ภายหลังจากการฉีดวัคซีน ยังมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ในปัจจุบัน (ในปัจจุบันมีข้อมูลอยู่ถึงประมาณ 3 เดือน หลังฉีด) จึงยังไม่มีข้อสรุปในขณะนี้ว่าท่านจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และเมื่อใด ภายหลังจากที่ได้รับ การฉีดวัคซีนครบทั้งสองเข็มแล้ว
- ▶ หากท่านมีประวัติการแพ้ยาหรือประวัติการแพ้อื่น ๆ รวมถึงโรคประจำตัวต่างๆ จำเป็นต้องแจ้งต่อบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลการฉีดวัคซีนของท่านเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการให้วัคซีน
- ▶ หากท่านมีภาวะเลือดออกง่ายหรือหยุดยาก เกล็ดเลือดต่ำ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ หรือกำลังได้รับยาป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด อาจพบการบวมซ้ำหรือจ้ำเลือดหลังการฉีดวัคซีนได้

ขั้นตอนในการฉีดวัคซีน



ข้อควรทราบหลังได้รับวัคซีน

- ▶ วัคซีนไม่ได้มีผลในการป้องกันโรคในทันทีหลังการฉีดเนื่องจากกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายหลังการฉีดวัคซีนจำเป็นต้องใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์เพื่อให้เกิดระดับของภูมิคุ้มกันในระดับที่เหมาะสมในการป้องกันโรคเมื่อได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย ในช่วง 3 สัปดาห์แรกหลังจากได้รับวัคซีน ผู้ได้รับวัคซีนยังมีความเสี่ยงในการเกิดโรคอยู่ตามปกติ หลังจากร่างกายมีการสร้างระดับภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมแล้ว (ประมาณ 3 สัปดาห์หลังการฉีดวัคซีน) ผู้ได้รับวัคซีนจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคลดลง ทั้งนี้ประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันโรคอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลด้วยปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยด้านปัจเจกบุคคลและปัจจัยแวดล้อม
- ▶ ท่านควรสังเกตอาการผิดปกติหลังได้รับวัคซีนตามคำแนะนำในเอกสารฉบับนี้



การประเมินก่อนกลับบ้าน ภายหลังจากสังเกตอาการผิดปกติหลังได้รับวัคซีนแล้ว 30 นาที

- ▶ ไม่มีอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ ผื่นขึ้น ตัวแดง คันตามร่างกาย หายใจไม่สะดวก หน้าแดง ปากและใบหน้าบวม คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด ใจสั่นผิดปกติ แน่นหน้าอก
- ▶ ไม่มีไข้เลือดผิดปกติ
- ▶ อุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต ชีพจร และการหายใจเป็นปกติ

คำแนะนำในการสังเกตอาการผิดปกติหลังได้รับวัคซีน

- ▶ หลังได้รับวัคซีนท่านควรสังเกตอาการแพ้ เช่น มีผื่นขึ้น ตัวแดง คันตามร่างกาย หายใจไม่สะดวก หน้าแดง ปากและใบหน้าบวม คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด ใจสั่นผิดปกติ แน่นหน้าอก หากท่านมีอาการผิดปกติหลังการฉีดวัคซีนท่านควรติดต่อสถานพยาบาลทันที เนื่องจากการแพ้รุนแรงเป็นภาวะที่อาจถึงแก่ชีวิตได้
- ▶ วัคซีนไม่มีผลต่อความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ แต่ผลข้างเคียงหลังได้รับวัคซีนบางอย่างอาจส่งผลต่อการขับขี่ยานพาหนะหรือการใช้งานเครื่องจักรกลได้ จึงควรพิจารณางดเว้นการขับขี่ยานพาหนะหรือใช้งานเครื่องจักรกลหากท่านมีอาการผิดปกติ และใช้ความระมัดระวังตามความเหมาะสม
- ▶ อาการผิดปกติที่พบได้บ่อยหลังการฉีดวัคซีนได้แก่ อาการกตเจ็บบริเวณตำแหน่งที่ฉีด อาการปวดบริเวณตำแหน่งที่ฉีด ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย อาการปวดกล้ามเนื้อ ครั่นเนื้อครั่นตัว อาการไข้ หนาวสั่น อาการปวดข้อ หรือ คลื่นไส้ รวมถึงอาการผิดปกติอื่นๆ ที่อาจพบได้เช่น บวมแดง ร้อนบริเวณตำแหน่งที่ฉีด ไข้เลือดไม่รุนแรง รู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัว อาเจียน อาการคล้ายไข้หวัด เจ็บคอ โดยอาการผิดปกติต่างๆ ดังกล่าวส่วนมากมักไม่รุนแรงและมักจะหายเองได้ภายใน 2-3 วันหรือในช่วงสัปดาห์แรก ท่านสามารถใช้ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ขนาด 500 มิลลิกรัม จำนวนครั้งละ 1-2 เม็ด เพื่อบรรเทาอาการปวดหรืออาการไข้ ได้ทุก 4-6 ชั่วโมง ตามความจำเป็น ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังได้รับการฉีดวัคซีน
- ▶ อาการผิดปกติหลังการฉีดวัคซีนอื่นๆ ที่พบได้น้อย (น้อยกว่าร้อยละ 1) ได้แก่ ต่อมทอนซิลอักเสบ เบื่ออาหาร มีหรือเวียนศีรษะ ปวดท้อง เหงื่อออกมากผิดปกติ อาการคัน มีผื่น
- ▶ สำหรับวัคซีนโควิด-19 แอสตราเซนเนกา พบรายงานภาวะการอักเสบของระบบประสาทในผู้ที่ได้รับวัคซีนจำนวน 2 ราย (ความชุกน้อยกว่าร้อยละ 0.01) ระหว่างการวิจัยวัคซีน แต่ทั้งนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีน

ข้อมูลวัคซีนเพิ่มเติม

(กรุณาสอบถามชื่อวัคซีนที่ท่านได้รับจากสถานพยาบาล)

สำหรับวัคซีนโควิด-19
แอสตราเซนเนกา



www.azcovid-19.com

สำหรับวัคซีนโควิด-19
Sinovac



<https://ddc.moph.go.th/dvp/news.php?news=17245&deptcode=>

สำหรับวัคซีนโควิด-19
อื่นๆ

